EUROPEAN RESUSCITATION COUNCIL

CCR Consell Català de Ressuscitació

RCP Consejo Español

Suport Vital Bàsic amb ús d'un Desfibril·lador Extern Automatitzat (DEA)

Comprovi la resposta

- Sacsegi amb cura
- Pregunti amb veu forta: "Es troba bé?

Si no respon

- Obri la via aèria i comprovi la respiració

Si no respon i no respira amb normalitat

- **Telefonar 112, enviï algú a buscar un DEA**

si respira amb normalitat

Col·loqui'l en la posició de recuperació
- Telefonar 112
- Continuï valorant que la respiració segueix essent normal

Inicïi compressions toràciques immediatament

- Col·loqui les seves mans al centre del pit
- Administri 30 compressions toràciques:
  - Premi amb fermesa almenys 5 cm, però no més de 6 cm de profunditat
  - Premi a una freqüència d'almenys 100/min, però no més de 120/min
- Si està entrenat i és capaç, combini compressions toràciques amb ventilacions. Altrament, continuï RCP només amb compressions
  - Col·loqui els seus llavis al voltant de la boca
  - Insufli constantment fins elevar el pit
  - Doni una nova respiració quan el pit es deprimeixi
- Continuï RCP 30 compressions i 2 ventilacions

Tan aviat com arribi el DEA Posi'l en marxa i col·loqui pegats

- Segueixi les instruccions verbals/visuals
- Col·loqui un pegat sota l'aixella esquerra
- Col·loqui l'altre pegat sota la clavícula dreta, a prop de l'estèrnum
- Si hi ha més d'un reanimador: no interrompi la RCP

Si està indicada la descàrrega

- Allunyis i administri la descàrrega
- Continuï RCP

Segueixi les instruccions del DEA

Continuï RCP a menys que estigui segur que la víctima s'ha recuperat i comença a respirar amb normalitat

www.erc.edu | info@erc.edu

Publicat l'octubre de 2015 per European Resuscitation Council vzm, Emile Vanderveldelaan 35, 2845 Niel, Bèlgica
Copyright: © European Resuscitation Council vzm Referència del producte: Poster_BLS_AED_Algorithm_CAT_V20160104